

ALL

番号	レジメン名(療法)	薬剤名(一般名)	投与量	投与日(Day)	1コース日数(日)	備考
1	JALSG Burkitt-ALL213 レジメンA療法 (1、3、5、7コース)	リツキシマブ	375mg/m ²	1、8	21	※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.4mg/m ²	5、12		
		ドキシソルピシン	50mg/m ²	5		
		シクロフォスファミド	600mg/m ²	2-4		
		デキサメタゾン	40mg/body	2-5、12-15		
		メトレキセート※	15mg/body	2		
		デキサメタゾン※	4mg/body	2		
		シタラビン※	40mg/body	2		
2	JALSG Burkitt-ALL213 レジメンB療法 (2、4、6、8コース)	リツキシマブ	375mg/m ²	1	22	※腫注投与用の薬剤
		メトレキセート	1000mg/m ²	2		
		シタラビン	2000mg/m ²	3、4		
		メチルプレドニゾン	50mg/body	2-4		
		メトレキセート※	15mg/body	2		
		デキサメタゾン※	4mg/body	2		
		シタラビン※	40mg/body	2		
		シクロフォスファミド	800mg/m ²	8		
3	JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法 60-65歳未満	ダウノルビシン	30mg/m ²	8-10	30	2/15-27の投与はDay15以降、7日間かけて減量。 ※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	8、15、22、29		
		L-アスバラギナーゼ	3000U/m ²	15、17、19、21、23、25、27、29		
		プレドニゾン	60mg/m ²	1-21		
		メトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		シタラビン※	40mg/body	1		
		シクロフォスファミド	1200mg/m ²	8		
4	JALSG Ph(-)B-ALL213 寛解導入療法 60歳未満	ダウノルビシン	45mg/m ²	8-10	30	2/15-27の投与方法について、65歳未満では投与期間短縮し7日間かけて減量、45-59歳では21日内投与7日間かけて減量。 ※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	8、15、22、29		
		L-アスバラギナーゼ	5000U/m ²	15、17、19、21、23、25、27、29		
		プレドニゾン	60mg/m ²	1-21		
		メトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		シタラビン※	40mg/body	1		
		シタラビン	1000mg/m ²	1-3		
5	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C1、4 60歳以上	エトボシド	100mg/m ²	1-3	4	※腫注投与用の薬剤
		L-アスバラギナーゼ	5000U/m ²	4		
		デキサメタゾン	40mg/body	1-3		
		メトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		シタラビン※	40mg/body	1		
		シタラビン	2000mg/m ²	1-3		
		エトボシド	100mg/m ²	1-3		
6	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C1、4 60歳未満	L-アスバラギナーゼ	10000U/m ²	4	4	※腫注投与用の薬剤
		デキサメタゾン	40mg/body	1-3		
		メトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		シタラビン※	40mg/body	1		
		シタラビン	2000mg/m ²	1-3		
		エトボシド	100mg/m ²	1-3		
		L-アスバラギナーゼ	10000U/m ²	4		
7	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C2、5 50歳未満	メトレキセート	3000mg/m ²	1、15	21	※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、15		
		L-アスバラギナーゼ	10000U/m ²	3、17		
		メルカプトプリン	25mg/m ²	1-21		
		メトレキセート※	15mg/body	1、15		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1、15		
		シタラビン※	40mg/body	1、15		
		メトレキセート	1500mg/m ²	1、15		
8	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C2、5 50-60歳未満	ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、15	21	※腫注投与用の薬剤
		L-アスバラギナーゼ	10000U/m ²	3、17		
		メルカプトプリン	25mg/m ²	1-21		
		メトレキセート※	15mg/body	1、15		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1、15		
		シタラビン※	40mg/body	1、15		
		メトレキセート	1500mg/m ²	1、15		
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、15		
9	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C2、5 60歳以上65歳未満	L-アスバラギナーゼ	5000U/m ²	3、17	21	※腫注投与用の薬剤
		メルカプトプリン	25mg/m ²	1-21		
		メトレキセート※	15mg/body	1、15		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1、15		
		シタラビン※	40mg/body	1、15		
		メトレキセート	1500mg/m ²	1、15		
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、15		
		L-アスバラギナーゼ	5000U/m ²	3、17		
10	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C3 60歳未満	デキサメタゾン	10mg/m ²	1-8、15-22	42	※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、8、15		
		ダウノルビシン	45mg/m ²	1、8、15		
		シクロフォスファミド	1200mg/m ²	29		
		シタラビン	75mg/m ²	29-33、36-40		
		L-アスバラギナーゼ	5000U/m ²	2、4、6、9、11、13		
		メルカプトプリン	60mg/m ²	29-42		
		メトレキセート※	15mg/body	1、29		
11	JALSG Ph(-)B-ALL213 地固め療法C3 60歳以上	デキサメタゾン	10mg/m ²	1-8、15-22	42	※腫注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、8、15		
		ダウノルビシン	30mg/m ²	1、8、15		
		シクロフォスファミド	800mg/m ²	29		
		シタラビン	75mg/m ²	29-33、36-40		
		L-アスバラギナーゼ	3000U/m ²	2、4、6、9、11、13		
		メルカプトプリン	60mg/m ²	29-42		
		メトレキセート※	15mg/body	1、29		
12	JALSG Ph(-)B-ALL213 維持療法	デキサメタゾン※	4mg/body	1、29	28	※腫注投与用の薬剤
		シタラビン※	40mg/body	1、29		
		プレドニゾン	60mg/m ²	1-5		
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1		
13	JALSG Ph+ALL213 強化地固め療法	メトレキセート	20mg/m ²	1、8、15、22	31	2/15-27の投与はDay22以降、7日間かけて減量。 ※腫注投与用の薬剤
		メルカプトプリン	60mg/m ²	1-28		
		シクロフォスファミド	1200mg/m ²	1		
		ダウノルビシン	45mg/m ²	1-3		
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、8、15、22		
14	JALSG Ph+ALL213 地固め療法C1	プレドニゾン	60mg/m ²	1-31	31	60歳以上は特許付:1000mg/m ² へ減量 ※腫注投与用の薬剤
		ダサチニブ	100mg/body	4-31		
		メトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		メトレキセート	1000mg/m ²	1		
		シタラビン	2000mg/m ²	2-3		
		メチルプレドニゾン	50mg/body	1-3		
		ダサチニブ	100mg/body	4-24		
メトレキセート※	15mg/body	1				
デキサメタゾン※	4mg/body	1				
シクロフォスファミド	1200mg/m ²	2				

15	JALSG Ph+ALL213 地固め療法C2	ダウノルビシン	45mg/m ²	2	22	※糖注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	2		
		ブレドニゾロン	60mg/m ²	2-22		
		ダサチニブ	100mg/body	3-22		
		メソトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
16	JALSG Ph+ALL213 維持療法	ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1	35	*ブレドニゾロンはDay9以降、7日間 かけて減量。 *非糖注投与では地固め療法後、5 週ごとに123→5行う。
		ブレドニゾロン	60mg/m ²	1-14		
		ダサチニブ	100mg/body	1-28		
		シクロフォスファミド	1200mg/m ²	1		
17	JALSG202-0 寛解導入療法 25歳以上60歳未満	ダウノルビシン	60mg/m ²	1-3	22	
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、8、15、22		
		L-アスバラギナーゼ	3000U/m ²	9、11、13、16、18、20		
		ブレドニゾロン	60mg/m ²	1-21		
		シクロフォスファミド	800mg/m ²	1		
18	JALSG202-0 寛解導入療法 60歳以上	ダウノルビシン	30mg/m ²	1-3	22	ブレドニゾロンはDay9以降、7日間 かけて減量。
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、8、15、22		
		L-アスバラギナーゼ	3000U/m ²	9、11、13、16、18、20		
		ブレドニゾロン	60mg/m ²	1-14		
		シクロフォスファミド	3000mg/m ²	1-3		
19	hyper-CVAD	ドキシソルビシン	50mg/m ²	4	14	hyper-CVAD療法(1.3.5.7)-Aと 大量MTX+Ara-C療法(2.4.6.8 コース)交互に行う
		ビンクリスチン	1.4mg/m ²	4、11		
		デキサメタゾン	40mg/body	1-4、11-14		
		メソトレキセート	1000mg/m ²	1		
20	大量MTX+Ara-C	シタラビン	3000mg/m ²	2-3	22	hyper-CVAD療法(1.3.5.7)-Aと 大量MTX+Ara-C療法(2.4.6.8 コース)交互に行う
		メチルブレドニゾロン	50mg/body	1-3		
		シタラビン	2000mg/m ²	1-3		
21	JALSG ALL-201寛解導入療法 1、4コース、60歳未満	シタラビン	100mg/m ²	1-3	3	
22	JALSG ALL-201寛解導入療法 1、4コース、60歳以上	シタラビン	1000mg/m ²	1-3	3	
23	JALSG ALL-201 地固め療法 2、5コース	メソトレキセート	500mg/m ²	1、15	21	※糖注投与用の薬剤
		ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1、15		
		メルカプトプリン	25mg/m ²	1-21		
		メソトレキセート※	15mg/body	1、15		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1、15		
24	JALSG ALL-201 維持療法	ビンクリスチン	1.3mg/m ²	1	28	
		ブレドニゾロン	60mg/m ²	1-5		
		メソトレキセート	20mg/m ²	1、8、15、22		
		メルカプトプリン	60mg/m ²	1-28		
25	イノツズマブ	イノツズマブ	0.8mg/m ²	1	28	*1サイクル目day1と寛解が確ら れていない2サイクル目以降の Day1のみ0.8mg/m ² 投与
26	プリナツモマブ (1サイクル目)	プリナツモマブ	9 μg/day	1-7	42	左記は体重が45kg以上の場合、 体量が45kg未満の場合は15 μg/m ² で投与。
27	プリナツモマブ (2-5サイクル目)	プリナツモマブ	28 μg/day	8-28	42	左記は体重が45kg以上の場合、 体量が45kg未満の場合は15 μg/m ² で投与。
28	プリナツモマブ (6-9サイクル目)	プリナツモマブ	28 μg/day	1-28	84	左記は体重が45kg以上の場合、 体量が45kg未満の場合は15 μg/m ² で投与。