

AML

番号	レジメン名(療法)	薬剤名(一般名)	投与量	投与日(Day)	1コース日数(日)	備考
1	IDR+Ara-C	イダルビシン	12mg/m ²	1-3	28	
		シタラビン	100mg/m ²	1-7		
2	DNR+Ara-C	ダウノルビシン	50mg/m ²	1-5	28	
		シタラビン	100mg/m ²	1-7		
3	HD-AC	シタラビン	2000mg/m ² × 2	1-5	5	
4	A-triple V	エトボシド	100mg/m ²	1-5	10	
		シタラビン	200mg/m ²	1-5		
		ピンクリスチン	0.8mg/m ²	8		
		ビンデシン	2mg/m ²	10		
5	MTX+Ara-C	メソトレキセート	1000mg/m ²	1	4	
		シタラビン	1000mg/m ² × 2	2-3		
6	AA	アクリルピジシン	20mg/m ²	1-5	5	
		シタラビン	200mg/m ²	1-5		
7	DA	ダウノルビシン	50mg/m ²	1-3	5	併投注投与用の薬剤
		シタラビン	200mg/m ²	1-5		
		メソトレキセート※	15mg/body	1		
		デキサメタゾン※	4mg/body	1		
		シタラビン※	40mg/body	1		
8	MA	ミトキサントロン	7mg/m ²	1-3	5	
		シタラビン	200mg/m ²	1-5		
9	DNR+BH-AC	エトボシド	100mg/m ²	1-5	7	
		ダウノルビシン	50mg/m ²	1-3		
		エノシタピン	200mg/m ²	1-7		
		メルカプトプリン	70mg/m ²	1-7		
10	FLAGM	フルダラビン	15mg/m ² × 2	2-5	6	
		シタラビン	2000mg/m ² × 2	2-5		
		ミトキサントロン	10mg/m ²	4-6		
		フィルグラステム	75 μg/body	1-4		
		シタラビン	20mg/body	1-14		
11	AVG	エトボシド	50mg/body	1-14	14	
		フィルグラステム	75 μg/body	1-14		
		アクリルピジシン	14mg/m ²	1-4		
12	CAG	シタラビン	10mg/m ² × 2	1-14	14	
		フィルグラステム	75-100 μg/body	1-14		
		ゲムツズマフオソガマイシン	9mg/m ²	1		
13	GO	ゲムツズマフオソガマイシン	9mg/m ²	1	14	最大投与日まで投与可能
14	HAM	シタラビン	2000mg/m ² × 2	1-4	6	
		ミトキサントロン	10mg/m ²	1-5(最大6)		
15	AZA	アザシチジン	75mg/m ²	1-7	28	高齢者は5日間投与が推奨される
16	MEC	エトボシド	80mg/m ²	1-6	6	
		シタラビン	1000mg/m ²	1-6		
		ミトキサントロン	6mg/m ²	1-6		
17	ベネトクラクス+アザシチジン	ベネトクラクス	1コース目 Day1:100mg/day Day2:200mg/day Day3以降:400mg/day	1-28	28	
		アザシチジン	75mg/m ²	1-7		
18	ベネトクラクス+低用量シタラビン	ベネトクラクス	1コース目 Day1:100mg/day Day2:200mg/day Day3:400mg/day Day4以降:600mg/day	1-28	28	
		シタラビン	20mg/m ²	1-10		
19	ビキセオス(寛解導入)	ビキセオス	100ユニット(ダウノルビシン/シタラビンとして44mg/100mg)/m ²	1、3、5	1コース目14-35 2コース目35-56	最大2サイクルまで投与可能(1サイクル目に寛解に到達しなかった患者で、忍容性が良好な場合は、2サイクル目として1、3日目に投与)
20	ビキセオス(地固め)	ビキセオス	65ユニット(ダウノルビシン/シタラビンとして29mg/65mg)/m ²	1、3	35-56	最大2サイクルまで投与可能(寛解の寛解導入療法開始から5-8週間後に開始する。1サイクル目の投与開始後に病状が進行しておらず、忍容性が良好な場合は、2サイクル目として1、3日目に投与)