

膵がん

| 番号 | レジメン名(療法) | 薬剤名(一般名) | 投与量 | 投与日(Day) | 1コース日数(日) | 備考 |
|----|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | mFOLFIRINOX | レボホリナート | 200mg/m ² | 1 | 14 | いづれかを併用患者 (UGT1A1*6/*6、 UGT1A1*28/*28) 又はいづれも へ予備検査(UGT1A1*6/*28) として、予患者は除外 |
| | | フルオロウラシル(持続点滴) | 2400mg/m ² | 1 | | |
| | | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 1 | | |
| | | イリノテカン | 150mg/m ² | 1 | | |
| | | レボホリナート | 200mg/m ² | 1 | | |
| 2 | FOLFIRINOX | フルオロウラシル(急速静注) | 400mg/m ² | 1 | 14 | |
| | | フルオロウラシル(持続点滴) | 2400mg/m ² | 1 | | |
| | | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 1 | | |
| | | イリノテカン | 180mg/m ² | 1 | | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8、15 | | |
| 3 | GEM+nab-PTX | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8、15 | 28 | |
| | | パクリタキセル注射剤 (アルブミン懸濁型) | 125mg/m ² | 1、8、15 | | |
| 4 | GEM(1投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1 | 14 | |
| 5 | GEM(2投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8 | 21 | |
| 6 | GEM(2投2休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8 | 28 | |
| 7 | GEM(3投1休) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8、15 | 28 | |
| 8 | S1+GEM | エスワン | 80mg/m ² | 14日間内服、7日間休薬 | 21 | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8 | | |
| 9 | S1(2W/2W)+GEM(D1,15) | エスワン | 80mg/m ² | 14日間内服、14日間休薬 | 28 | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、15 | | |
| | | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8、15 | | |
| 10 | GEM+エルロチニブ | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 1、8、15 | 28 | |
| | | エルロチニブ | 100mg/body | 1-28 | | |