

膵がん

番号	レジメン名(療法)	薬剤名(一般名)	投与量	投与日(Day)	1コース日数(日)	備考
1	mFOLFIRINOX	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	いずれかを併用投与 (UGT1A1*6/*6、 UGT1A1*28/*28) 又はいずれも へ予知遺伝子(UGT1A1*6/*28) として、予知患者は除外
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m ²	1		
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		イリノテカン	180mg/m ²	1		
		レボホリナート	200mg/m ²	1		
2	FOLFIRINOX	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m ²	1	14	
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m ²	1		
		オキサリプラチン	85mg/m ²	1		
		イリノテカン	180mg/m ²	1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8、15		
3	GEM+nab-PTX	パクリタキセル注射剤 (アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	1、8、15	28	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1		
4	GEM(1投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1	14	
5	GEM(2投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8	21	
6	GEM(2投2休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8	28	
7	GEM(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8、15	28	
8	S1+GEM	エスワン	80mg/m ²	14日間内服、7日間休薬	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8		
9	S1(2W/2W)+GEM(D1,15)	エスワン	80mg/m ²	14日間内服、14日間休薬	28	
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、15		
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8、15		
10	GEM+エルロチニブ	ゲムシタビン	1000mg/m ²	1、8、15	28	
		エルロチニブ	100mg/body	1-28		
		イリノテカン(リボソーム製剤)	70mg/m ² (※50mg/m ²)	1		
11	イリノテカン(リボソーム製剤) +5FU/LV	レボホリナート	200mg/m ²	1	14	UGT1A1*6/*6、UGT1A1*28/*28の併用投与 を要する患者、又はUGT1A1*6/*6及びUGT1A1*28 /*28の併用投与を必要とする患者にのみ適用して 100mg/m ² を標準用量とする。有効性がある 場合は100mg/m ² に標準とする。
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	1		