大腸がん						
番号	レジメン名(療法)	薬剤名(一般名)	投与量	投与日(Day)	1コース日数(日)	備考
1	B-mab+CPT-11	ベバシズマブ イリノテカン	5mg/kg 150mg/m2	1	14	
2	B-mab+FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	1	14	
		レボホリナート フルオロウラシル(急速静注)	200mg/m2	1		
2		フルオロウラシル(忌迷評注)	400mg/m2 2400mg/m2	1		
		イリノテカン	150mg/m2	1		
3	B-mab+FOLFOX4	ベバシズマブ レボホリナート	5mg/kg 100mg/m2	1 1, 2	14	
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1,2		
		フルオロウラシル(持続点滴)	600mg/m2	1,2		
		オキサリプラチン ベバシズマブ	85mg/m2 5mg/kg	1		
4	B-mab+mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m2	1	14	
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1		
		フルオロウラシル(持続点滴) オキサリプラチン	2400mg/m2 85mg/m2	1		
5	B-mab+トリフルリジン/	ベバシズマブ	5mg/kg	1, 15	28	
	チピラシル	トリフルリジン/チピラシル	70mg/m2	5日間内服、2日間休薬を2週間、その後14日間休薬	20	
	C-mab+FOLFOX4	セツキシマブ レボホリナート	初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2 100mg/m2	1,8	14	
6		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1,2		
		フルオロウラシル(持続点滴)	600mg/m2	1,2		
7	C-mab	オキサリプラチン セツキシマブ	85mg/m2 初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2	1	7	
		セツキシマブ	初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2	1,8		
8	C-mab+FOLFIRI(外来用)	レボホリナート フルオロウラシル(急速静注)	200mg/m2 400mg/m2	1	14	
٥		フルオロウラシル(忌述所注)	2400mg/m2	1		
		イリノテカン	150mg/m2	1		
	C-mab+FOLFIRI(入院用)	セツキシマブ レボホリナート	初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2 200mg/m2	1,8	14	
9		フルオロウラシル(急速静注)	200mg/m2 400mg/m2	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	1200mg/m2	1,2		
-		イリノテカン セツキシマブ	150mg/m2 初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2	1 1,8		
	C-mab+mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m2	1	14	
10		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1		
		フルオロウラシル(持続点滴) オキサリプラチン	2400mg/m2 85mg/m2	1		
11	CPT-11	イリノテカン	150mg/m2	1	14	
12	IRIS	エスワン	80mg/m2	14日間内服、7日間休薬	21	
		イリノテカン レボホリナート	150mg/m2 250mg/m2	1	_	
13	LF	フルオロウラシル	600mg/m2	1	7	
14	mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m2	1	14	
		フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続点滴)	400mg/m2 2400mg/m2	1		
		オキサリプラチン	85mg/m2	1		
15	P-mab+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	1	14	
16		イリノテカン パニツムマブ	150mg/m2 6mg/kg	1	14	
	P-mab+FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m2	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1		
		フルオロウラシル(持続点滴) イリノテカン	2400mg/m2 150mg/m2	1		
	P-mab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	i	14	
17		レボホリナート	200mg/m2	1		
		フルオロウラシル(急速静注) フルオロウラシル(持続点滴)	400mg/m2 2400mg/m2	1		
		オキサリプラチン	85mg/m2	1		
18	P-mab+S1+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg 80mg/m2	1、15 14日間内服、14日間休薬	28	
10	P-Mab+31+GP1-11	エスワン イリノテカン	80mg/m2 100mg/m2	14日间内版、14日间外采 1、15	20	
19	P-mab	パニツムマブ	6mg/kg	1	14	
		ラムシルマブ レボホリナート	8mg/kg 200mg/m2	1		
20	RAM+FOLFIRI	フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m2	1	14	
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m2	1		
		イリノテカン レボホリナート	150mg/m2 10mg/m2	1 1-4		・RT:total 45Gy。LFはRT療法と
21	RT+LF(直腸がん)	フルオロウラシル	400mg/m2	1-4	28	併用で、D1-4、D29-32 23-A施行。
22	SOX	オキサリプラチン	100mg/m2もしくは130mg/m2	1408中昭 2084举	21	
-		エスワン ベバシズマブ	80mg/m2 7.5mg/kg	14日間内服、7日間休薬		
23	SOX+B-mab	オキサリプラチン	100mg/m2もしくは130mg/m2	i	21	
		エスワン	80mg/m2	14日間内服、7日間休薬		
24	XELOX	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m2 2000mg/m2	1 14日間内服、7日間休薬	21	
25	XELOX+B-mab	ベバシズマブ	7.5mg/kg	1	21	
		オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m2	1 14日間内服、7日間休薬		
26	IRIS+B-mab	カヘンダビン ベバシズマブ	2000mg/m2 7.5mg/kg	14日间内服、/日间怀楽 1	21	
		イリノテカン	150mg/m2	1		
		エスワン ベバシズマブ	80mg/m2 7.5mg/kg	14日間内服、7日間休薬		
27		イリノテカン	7.5mg/kg 150mg/m2もしくは200mg/m2	1		イリノテカンは、(UGT1A1 野生型・シングルヘテロ)は200mg/m2。それ以外は150mg/m2
		カペシタビン	1600mg/m2	14日間内服、7日間休薬		コーストルトスノンニ小果知ら
28	ヤーボイ+オプジーボ	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	1	21	与 オプジーボ240mg、2週間間隔も
29	ビラフトビ+メクトビ+セツキシ マブ	エンコラフェニブ	300mg/body	1-7	7	〈(ナナブ×)―ボ480ms 4週間
		ビニメチニブ	90mg/body	1-7		
		セツキシマブ エンコラフェニブ	初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2 300mg/body	1 1-7		
30	ビラフトビ+セツキシマブ	セツキシマブ	初回400mg/m2、2回目以降250mg/m2	1	7	
21	Day - 1: (5711/13/	フルオロウラシル	500mg/m2	1, 8, 15, 22, 29, 36	56	
31	Bmab+5FU/LV	レボホリナート ベバシズマブ	250mg/m2 5mg/kg	1, 15, 29, 43	56	
32	ペルツズマブ+トラスツズマブ	ペルツズマブ	初回840mg/body、2回目以降420mg/body	1	21	
		トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	1 1		i .