

大腸がん

番号	レジメン名(療法)	薬剤名(一般名)	投与量	投与日(Day)	1コース日数(日)	備考
1	B-mab+CPT-11	ペバシズマブ	5mg/kg	1	14	
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
2	B-mab+FOLFIRI	ペバシズマブ	5mg/kg	1	14	
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
3	B-mab+FOLFOX4	ペバシズマブ	5mg/kg	1	14	
		レボホリナート	100mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		フルオロウラシル(持続点滴)	600mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
4	B-mab+mFOLFOX6	ペバシズマブ	5mg/kg	1	14	
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
5	B-mab+トリフルリジン/ チピラシル	ペバシズマブ	5mg/kg	1、15	28	5日間内服、2日間休薬を2週間、その後14日間休薬
		トリフルリジン/チピラシル	70mg/m <sup>2</sup>	1		
6	C-mab+FOLFOX4	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	1、8	14	
		レボホリナート	100mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		フルオロウラシル(持続点滴)	600mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
7	C-mab	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	1	7	
		セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	1、8		
8	C-mab+FOLFIRI(外来用)	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
9	C-mab+FOLFIRI(入院用)	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	1、8	14	
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	1200mg/m <sup>2</sup>	1、2		
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
10	C-mab+mFOLFOX6	セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 、2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	1、8	14	
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
11	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1	14	
12	IRIS	エスワン	80mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬	21	
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
13	LF	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>	1	7	
		フルオロウラシル	600mg/m <sup>2</sup>	1		
14	mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
15	P-mab+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	1	14	
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
		パニツムマブ	6mg/kg	1		
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
16	P-mab+FOLFIRI	フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
		パニツムマブ	6mg/kg	1		
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
17	P-mab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	1	14	
		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	1		
18	P-mab+S1+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	1、15	28	
		エスワン	80mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、14日間休薬		
		イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	1、15		
19	P-mab	パニツムマブ	6mg/kg	1	14	
		ラムシルマブ	8mg/kg	1		
20	RAM+FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		フルオロウラシル(急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>	1		
		フルオロウラシル(持続点滴)	2400mg/m <sup>2</sup>	1		
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
		レボホリナート	10mg/m <sup>2</sup>	1-4		
21	RT+LF(直腸がん)	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	1-4	28	RT-total 45Gy、LFはRT療法と併用で、D1-4、D29-32 23-36施行。
		オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup> もしくは130mg/m <sup>2</sup>	1		
22	SOX	エスワン	80mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬	21	
		ペバシズマブ	7.5mg/kg	1		
23	SOX+B-mab	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup> もしくは130mg/m <sup>2</sup>	1	21	
		エスワン	80mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬		
24	XELOX	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	1	21	
		カベシタピン	2000mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬		
25	XELOX+B-mab	ペバシズマブ	7.5mg/kg	1	21	
		オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	1		
		カベシタピン	2000mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬		
26	IRIS+B-mab	ペバシズマブ	7.5mg/kg	1	21	
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	1		
		エスワン	80mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬		
27	mXELIRI+B-mab	ペバシズマブ	7.5mg/kg	1	21	イリノテカンは、UGT1A1 野生型かつCYP2D6はPM(≧200mg/m <sup>2</sup> 、それ以外は150mg/m <sup>2</sup> )
		イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup> もしくは200mg/m <sup>2</sup>	1		
		カベシタピン	1600mg/m <sup>2</sup>	14日間内服、7日間休薬		