肺がん

番号	レジメン名（療法）	薬剤名（一般名）	投与量	投与日（Day）	1コース日数（日）	備考
1	ADOC	ドキソルビシン	40mg/m2	1	5	
		シスプラチン	50mg/m2	1		
		ビンクリスチン	0.6mg/m2	3		
		シクロホスファミド	700mg/m2	4		
2	CPT-11	イリノテカン	150mg/m2	1	14	
3	ペバシズマブ＋S1	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	
		エスワン	80mg/m2	14日間内服、7日間休薬		
4	ペバシズマブ＋S1＋CBDCA	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	
		エスワン	80mg/m2	14日間内服、7日間休薬		
		カルボプラチン	AUC=5	1		
5	CBDCA＋VNR	カルボプラチン	AUC=5	1	21	
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
6	CBDCA＋VP-16	カルボプラチン	AUC=5	1	21	
		エトポシド	80mg/m2	1、2、3		
7	CDDP＋GEM	シスプラチン	80mg/m2	1	21	
		ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8		
8	CDDP＋VNR	シスプラチン	80mg/m2	1	21	
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
9	CDDP＋VP-16＋放射線	シスプラチン	40-50mg/m2	1、8	21	
		エトポシド	60-80mg/m2	1、2、8、9		
10	CDDP＋VP-16	シスプラチン	80mg/m2	1	28	1クール21日間の場合も有り
		エトポシド	100mg/m2	1、2、3		
11	DOC＋CBDCA	ドセタキセル	60mg/m2	1	21	
		カルボプラチン	AUC=5	1		
12	DOC＋CDDP	ドセタキセル	60mg/m2	1	21	
		シスプラチン	80mg/m2	1		
13	ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m2	1	21	
14	ゲフィチニブ＋PEM	ゲフィチニブ	250mg	2-16	21	
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
15	エルロチニブ＋PEM	エルロチニブ	150mg	2-16	21	
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
16	GCP	ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8	21	
		シスプラチン	50mg/m2	1、8		
		パクリタキセル	125mg/m2	1、8		
17	GEM＋CBDCA	ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8	21	
		カルボプラチン	AUC=5	1		
18	GEM＋CPT-11	ゲムシタビン	1000mg/m2	1、15	28	
		イリノテカン	150mg/m2	1、15		
19	GEM＋VNR	ゲムシタビン	800mg/m2	1、8	21	GEM:800-1000mg/m2 VNR:20-25mg/m2
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
20	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	1	21	適応は小細胞肺癌のみ
21	PTX＋CDDP	パクリタキセル	200mg/m2	1	21	
		シスプラチン	80mg/m2	1		
22	CDDP＋低用量PTX	パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15	28	
		シスプラチン	80mg/m2	1		
23	split CDDP+CPT-11	シスプラチン	30mg/m2	1、8	21	試験では4サイクルまで CPT-11は80-85mg/m2試験もあり
		イリノテカン	65mg/m2	1、8		
24	TJ（低用量PTX3回）	パクリタキセル	70mg/m2	1、8、15	28	
		カルボプラチン	AUC=6	1		
25	TJ（低用量PTX2回）	パクリタキセル	80mg/m2	1、8	21	
		カルボプラチン	AUC=6	1		
26	S1+CDDP±放射線	エスワン	80mg/m2	14日間内服、14日間休薬	28	2Gy×30fr
		シスプラチン	60mg/m2	1		
27	S1+CDDP	エスワン	80mg/m2	21日間内服、35日間休薬	56	
		シスプラチン	80mg/m2	8		
28	S1＋CBDCA	エスワン	80mg/m2	14日間内服、7日間休薬	21	
		カルボプラチン	AUC=5	1		
29	ビノレルビン	ビノレルビン	25mg/m2	1、8、15	28	
30	weekly CPT-11	イリノテカン	100mg/m2	1、8、15	28	
31	weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m2	1、8、15	28	
32	ペバシズマブ＋GEM＋VNR	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	GEM:800-1000mg/m2 VNR:20-25mg/m2
		ゲムシタビン	1000mg/m2	1、8		
		ビノレルビン	25mg/m2	1、8		
33	ペバシズマブ＋PTX＋CBDCA	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	
		パクリタキセル	200mg/m2	1		
		カルボプラチン	AUC=5-6	1		
34	ペバシズマブ＋PEM＋CBDCA	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
		カルボプラチン	AUC=5	1		
35	ペバシズマブ＋PEM＋CDDP	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
		シスプラチン	75mg/m2	1		
36	ペバシズマブ＋DTX	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	DOC60-75mg/m2
		ドセタキセル	60mg/m2	1		
37	アバスチン	アバスチン	15mg/kg	1	21	
38	PEM＋CBDCA	ペメトレキセド	500mg/m2	1	21	パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		カルボプラチン	AUC=5	1		
39	PEM＋CDDP	ペメトレキセド	500mg/m2	1	21	非重篤腎機能障害を有する場合、Cl=30未満で、 ペメトレキセドについて、投与7日前より葉酸（経口）、ビタミンB12筋注（6週毎）、葉酸は最終投与日から21日目で内服、ビタミンB12は投与4週後以降は3週毎に投与。 必要に応じてオランザピンを0mg1-4に内服。
		シスプラチン	75mg/m2	1		
40	ノギテカン	ノギテカン	1mg/m2	1-5	21	
41	TJ	パクリタキセル	200mg/m2	1	21	
		カルボプラチン	AUC=6	1		
42	ニボルマブ(2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	1	14	
43	ペムブロリズマブ＋nabPTX+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	5サイクル以降はイトルーザ単独
		パクリタキセル注射剤（アルブミン懸濁型）	100mg/m2	1、8、15		
		カルボプラチン	AUC=6	1		
44	ペムブロリズマブ＋PEM＋CDDP	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	5サイクル以降はイトルーザ＋PEM パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
		シスプラチン	75mg/m2	1		
45	ペムブロリズマブ＋TJ	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	5サイクル以降はイトルーザ単独
		パクリタキセル	200mg/m2	1		
		カルボプラチン	AUC=6	1		
46	DTX＋ラムシルマブ	ドセタキセル	60mg/m2	1	21	
		ラムシルマブ	10mg/kg	1		
47	ペバシズマブ＋PEM	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
48	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	1	21	パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
49	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	
50	アテゾリズマブ＋VP-16＋CBDCA	アテゾリズマブ	1200mg/body	1	21	
		エトポシド	100mg/m2	1-3		
		カルボプラチン	AUC=5	1		
51	ペムブロリズマブ＋PEM＋CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	1	21	5サイクル以降はイトルーザ＋PEM パンビタン末を1週間以上前から内服開始 ビタミンB12を3週ごとに筋注
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
		カルボプラチン	AUC=5	1		
52	ペバシズマブ＋エルロチニブ	ペバシズマブ	15mg/kg	1	21	
		エルロチニブ	150mg/body	21日間内服		
53	AMR	アムルビシン	45mg/m2	1-3	21-28	
54	CDDP＋CPT-11	シスプラチン	80mg/m2	1	28	CDDP:60mg/m2の場合も有り
		イリノテカン	60mg/m2	1、8、15		
55	CBDCA＋CPT-11	カルボプラチン	AUC=4	1	28	
		イリノテカン	60mg/m2	1、8、15		
56	TJ＋放射線	パクリタキセル	40mg/m2	1、8、15、22、29、35	35	放射線は2Gy×5日×6週間
		カルボプラチン	AUC=2	1、8、15、22、29、35		
57	ニボルマブ(4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	1	28	
58	オプジーボ+ヤーボイ+CBDCA+PEM療法	ニボルマブ	360mg/body	1、22	42	2コース目からはオプジーボとヤーボイのみ投与。
		イピリムマブ	1mg /kg	1		
		ペメトレキセド	500mg/m2	1、22		
		カルボプラチン	AUC=5	1、22		
59	デュルバルマブ＋VP-16＋CBDCA	デュルバルマブ	1500mg/body	1	21	ポラフィンジについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。VP-16＋CBDCA療法は4クールまでとし、その後は、ﾃｾﾚﾝﾊﾟﾗﾝ単独で継続。
		エトポシド	80-100mg/m2	1-3		
		カルボプラチン	AUC=5-6	1		
60	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	1	42	
61	アテゾリズマブ＋CBDCA＋PTX＋ペバシズマブ療法	アテゾリズマブ	1200mg/body	1	21	3コース目からはアテゾリズマブとペバシズマブのみ投与。
		カルボプラチン	AUC=6	1		
		パクリタキセル	200mg/m2	1		
		ペバシズマブ	15mg/kg	1		
62	トレメリブマブ＋デュルバルマブ＋ペメトレキセド＋CBDCA療法（1-4コース）	トレメリブマブ	75mg/body	1	21	4コース投与後、トレメリブマブ＋デュルバルマブ＋ペメトレキセド維持療法（A期）に移行。 デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。 ペメトレキセドについて、投与7日前より葉酸（経口）、ビタミンB12筋注（6週毎）、葉酸は最終投与日から21日目で内服、ビタミンB12は投与4週後以降は3週毎に投与。
		デュルバルマブ	1500mg/body	1		
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
		カルボプラチン	AUC=6	1		
63	トレメリブマブ＋デュルバルマブ＋ペメトレキセド維持療法（A期）	トレメリブマブ	75mg/body	29	56	13コ目以降、デュルバルマブ＋ペメトレキセド維持療法（3週）に移行。 デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。 ペメトレキセドについて、投与7日前より葉酸（経口）、ビタミンB12筋注（6週毎）、葉酸は最終投与日から21日目で内服、ビタミンB12は投与4週後以降は3週毎に投与。
		デュルバルマブ	1500mg/body	1、29		
		ペメトレキセド	500mg/m2	1、29		
64	デュルバルマブ＋ペメトレキセド維持療法（B期）	デュルバルマブ	1500mg/body	1	28	デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。 ペメトレキセドについて、投与7日前より葉酸（経口）、ビタミンB12筋注（6週毎）、葉酸は最終投与日から21日目で内服、ビタミンB12は投与4週後以降は3週毎に投与。
		ペメトレキセド	500mg/m2	1		
65	トレメリブマブ＋デュルバルマブ＋nab-PTX＋CBDCA療法（1-4コース）	トレメリブマブ	75mg/body	1	21	4コース投与後、トレメリブマブ＋デュルバルマブ療法（A期）へ移行。 デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。
		デュルバルマブ	1500mg/body	1		
		パクリタキセル注射剤（アルブミン懸濁型）	100mg/m2	1、8、15		
		カルボプラチン	AUC=6	1		
66	トレメリブマブ＋デュルバルマブ療法（A期）	トレメリブマブ	75mg/body	29	56	デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。 1コース目今後、デュルバルマブ療法（B期）へ移行
		デュルバルマブ	1500mg/body	1、29		
67	デュルバルマブ療法（B期）	デュルバルマブ	1500mg/body	1	28	デュルバルマブについて、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。
68	ニボルマブ（3週毎）＋イピリムマブ療法	イピリムマブ	1mg/kg	1	42	ニボルマブは240mg/回で2週間隔で投与も可能。
		ニボルマブ	360mg/body	1,22		